

GelBux®

Gel oral bioadherente

Descripción

Gel que forma una película protectora que, al adherirse a la mucosa de la cavidad bucofaringea, recubre las terminaciones nerviosas expuestas.

Composición

Ingredientes: Agua purificada, povidona, maltodextrina, propilenglicol, aceite de ricino hidrogenado polioxilado 40, benzoato de sodio, homopolímero de carbómero, sorbato de potasio, hidroxietil celulosa, cloruro de cetilpiridinio, edetato disódico, hialuronato de sodio, sacarina sódica, ácido glicirretínico, hidróxido de sodio.

Indicaciones

Coadyuvante en el tratamiento de las lesiones de la cavidad bucofaringea. Gelbux forma una película en la cavidad bucal gracias al efecto mecánico de barrera protectora, ayudando a disminuir el dolor generado por estados irritativos e inflamatorios de diversas etiologías:

- Mucositis y estomatitis (que puede ser causada por quimioterapia o radioterapia).
- Irritación por intervenciones quirúrgicas en la cavidad oral.
- Úlceras traumáticas causadas por aparatos de ortodoncia, dentaduras mal ajustadas, la vejez o por otras enfermedades (como candidiasis y herpes oral).
- Úlceras aftosas difusas.

Efectos adversos

Hasta la fecha no se han descrito. Sin embargo, no se aconseja la utilización del producto en personas con hipersensibilidad comprobada a alguno de sus ingredientes.

Precauciones y advertencias

Hipersensibilidad comprobada a alguno de sus componentes.

No existen interacciones conocidas con medicamentos u otros productos. Sin embargo, puede reducir la absorción de medicamentos sublinguales; en caso del uso de este tipo de medicamentos, consulte a su médico.

Evite comer o beber durante al menos 30 - 60 minutos después del tratamiento.

No use el producto si el sobre está dañado o ha alcanzado su fecha de caducidad.

El gel puede llegar a ser un poco más oscuro y espeso con el tiempo, pero esto no afecta su eficacia o seguridad.

Si no observa mejoría después de 7 días de tratamiento, consulte a su médico. El tratamiento debe ser discontinuado después de 4 semanas. Puede ser usado durante el embarazo y lactancia.

El producto no afecta la capacidad de conducir o utilizar máquinas.

Dosis y vía de administración

Gelbux se emplea tres o cuatro veces al día o de acuerdo a su necesidad. Se recomienda aplicar al menos 30 - 60 minutos antes de cada comida. Verter el contenido de un sobre en un vaso, añadir aproximadamente de 15 a 40 mL de agua (1 - 3 cucharadas soperas) y mezclar hasta obtener una solución uniforme.

Con la solución obtenida, enjuagar inmediatamente la boca, hacer gárgaras para recubrir los tejidos de la cavidad bucofaringea, manteniéndolo por lo menos durante un minuto o tanto sea posible en la lengua, el paladar, la garganta, el interior de las mejillas y completamente en todo el tejido bucal, y escupir la solución.

Gelbux puede utilizarse también sin diluir en caso de no disponer de agua. No ingerir. Desechar la cantidad de enjuague bucal no utilizada.

Para niños menores de 6 años que no pueden hacer gárgaras, Gelbux puede ser aplicado con un hisopo de algodón.

Ingestión accidental / Sobredosis

No se han reportado casos de sobredosis. Si bien no se esperan efectos adversos a la ingestión accidental de Gelbux, no se recomienda su ingestión.

Presentación

Sobre laminado monodosis con 15 mL.
Caja con 3, 5, 7, 10, 14, 15, 21 y 30 sobres.

Recomendaciones sobre almacenamiento

Almacene a temperatura ambiente, alejado de la luz solar directa.

Legendas de protección

El producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
Reporte cualquier incidente al correo: tecnovigilancia@zeyco.mx

Fabricado en México por:

Laboratorios Zeyco, S.A. de C.V.

Calle Camino a Santa Ana Tepetitlán No. 2230,
Interior C, Colonia Santa Ana Tepetitlán,
C.P. 45230, Zapopan, Jalisco, México.

ZEYCO

Distribuido por:

Gala Pharma, S.A. de C.V.

Calle Electrón No. 28, Interior A09-3,
Colonia Zona Industrial Parque Industrial Naucalpan, C.P.
53489, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México.



Fecha de revisión: 20/02/2024.